

Abraham Gottlob Werner's

lehtes

Mineral-System.

Inventarverzeichnis  
1700.11 A 7  
Nr.:

Aus

dessen Nachlasse

auf

oberbergamtliche Anordnung

herausgegeben

und

mit Erläuterungen versehen.



Freyberg und Wien,  
bey Cras und Gerlach und bey Carl Gerold.

1817.

## 15) Kobold-Geschlecht.

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Sipf. d. Speiskob.     | { | 291. Weißer Speiskobold,                 |
|                        |   | a. dichter Weißer Speiskobold,           |
|                        |   | b. *safricher Weißer Speiskobold,        |
|                        |   | c. ***gestrikter Weißer Speiskobold. 65) |
|                        |   | 292. Grauer Speiskobold.                 |
|                        |   | 293. Glanzkobold.                        |
| Sipf. des Erdfkobolds. | { | 294. Schwarzer Erdfkobold,               |
|                        |   | a. schwarzer Kobold-Mulm,                |
|                        |   | b. fester schwarzer Erdfkobold,          |
|                        |   | 295. Brauner Erdfkobold.                 |
|                        |   | 296. Gelber Erdfkobold.                  |
|                        |   | 297. Rother Erdfkobold,                  |
|                        |   | a. Koboldbestlag,                        |
|                        |   | b. Koboldblüthe.                         |

## 16) Arsenik-Geschlecht.

298. Gediegen Arsenik.
299. Arsenikfließ,
- a. gemeiner Arsenikfließ,
- b. Weiserz.
300. Kauschgelb,
- a. gelbes Kauschgelb,
- b. rothes Kauschgelb.
301. Arsenikblüthe.

## 17) Molibdan-Geschlecht.

302. Wasserblei.